

ختنه به روش حلقه

ختنه چیست؟

نوعی عمل جراحی است که در آن پوست روی ختنه گاه (حشفه) برداشته می شود.

قبل از عمل ختنه به روش حلقه، چه کاری انجام می شود؟

اقدام خاصی قبل از عمل لازم نیست. این عمل با بی حسی موضعی انجام می شود.

بعد از عمل چه وقت مرخص می شود؟

در صورت نداشتن خونریزی و ادرار کردن مرخص می شود.

در خانه چطور از کودکم مراقبت کنم؟

- بعد از عمل محل ختنه قرمز و حساس است و کمی ورم دارد. بعد از 3 روز این حساسیت کمتر می شود. محل عمل 7 تا 10 روز بعد خوب می شود.
- حلقه بعد از 7 تا 12 روز می افتد.
- پوشک را به صورت شل ببندید یا از یک پوشک با سایز بزرگتر استفاده کنید.
- بعد از هر بار تعویض پوشک، محل را با آب ولرم تمیز کنید. هنگام تمیز کردن پوست را به عقب نکشید
- بعد از عمل تا دو روز می توانید پماد تتراسایکلین روی محل بزنید. از روز سوم پماد وازلین روی محل بزنید این کار نرم شدن محل عمل و مانع تماس مستقیم محل با پوشک می شود و درد کمتر میشود
- برای کاهش درد می توانید هر 4-6 ساعت استامینوفن (طبق تجویز پزشک) بدهید.
- 2 روز بعد از عمل می توانید کودک خود را به حمام ببرید.
- در روزهای اول از پوشاندن شورت یا شلوار تنگ خودداری کنید.



وزارت بهداشت و آموزش پزشکی




مرکز آموزشی و درمانی کودکان



آموزش سلامت

تاریخ تهیه: 88/05

آخرین بازنگری: 96/05



چه وقت لازم است که فرزندم را به پزشک ببرم؟

- اگر تب داشته باشد (بیشتر از 38 درجه)
- بعد از 3 روز هنوز نوک آلت قرمز و ملتهب است.
- رنگ نوک آلت سیاه شده باشد.
- حلقه پلاستیکی از محل جدا شده باشد.
- اگر کودک ادرار قطره قطره داشته باشد.
- از محل ختنه خونریزی به صورت چکه چکه داشته باشد.
- محل ختنه ورم کرده و چرک خارج می شود.
- اگر بی حال است.

این برگ آموزشی تنها به عنوان راهنما بوده و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک معالج کودک شما نمی باشد.

اگر شما توصیه‌ها یا اطلاعات بیشتری نیاز دارید لطفاً با شماره تلفن
35262250 - داخلی 204 تماس بگیرید.