


برای بستری کردن کودکم چه کاری باید انجام دهم؟

پس از مراجعه به دکتر و تشخیص نیاز به عمل، دکتر دو برگ بستری می نویسد و شما برگ بستری را به بخش جراحی می برید تا نوبت عمل داده شود.

عمل جراحی چگونه انجام می شود؟

بیهوشی کودک شما از نوع بیهوشی عمومی است. جراح یک برش کوچکی زیر شکم ایجاد می کند و لوله باز شده به شکم را می بندد. عمل 1 تا 1.5 ساعت طول می کشد و معمولاً 2 یا 3 ساعت طول می کشد تا کودک شما کاملاً بیدار شود.



محل برش جراحی

چه وقت کودک مرخص می شود؟

اگر بتواند به خوبی مایعات بخورد، ضربان قلب و تنفسهای طبیعی داشته باشد، بعد از عمل ادرار کرده و استفراغ نداشته باشد و محل عمل هم خونریزی نداشته باشد می تواند مرخص شود.

چطور تشخیص داده می شود؟

خیلی از هیدروسل ها ورم ندارند و دردناک نیستند. دکتر با معاینه و یا با سونوگرافی تشخیص می دهد. گاهی ورم کیسه در اثر فتق اتفاق می افتد و فتق باعث هیدروسل می شود. دکتر، کودک شما را از نظر فتق هم معاینه می کند.

چگونه درمان می شود؟

➤ بعضی وقتها هیدروسل خود به خود خوب می شود
اگر در طول روز اندازه کیسه بیضه تفاوتی نکند و با زور زدن بچه بزرگتر نشود در 6 تا 12 ماه اول زندگی، خودبخود از بین می رود و به اقدام خاصی نیاز ندارد.

➤ ولی اگر پس از 1 یا 1.5 سالگی از بین نرفت نیاز به عمل جراحی دارد. اگر فتق هم اتفاق افتاده لازم است جراحی انجام شود.

➤ اگر اندازه کیسه بیضه در ساعات اولیه روز کوچک بوده و با شروع فعالیت کودک پس از چند ساعت اندازه کیسه بزرگتر شود و دوباره پس از استراحت کوچکتر شود حتماً به دکتر ببرید چون کودک شما نیاز به عمل جراحی دارد.

➤ اگر علت عفونت باشد آنتی بیوتیک (داروی چرک) شروع می شود.

1 راه برده شود(اضافه گردد)

این پمفلت در مورد هیدروسل و آنچه که باید قبل و بعد از عمل انجام دهید، اطلاعاتی را به شما می دهد.

هیدروسل چیست؟

هیدرو به معنی آب و سل به معنی کیسه است. پس هیدروسل یعنی کیسه آب، که آب آوردن بیضه هم گفته می شود. یعنی اطراف بیضه را مایع شفاف می گیرد. معمولاً یک طرفه هست ممکن است دو طرفه هم باشد. هیدروسل در نوزادان و در سمت راست بیشتر دیده می شود.

علت هیدروسل چیست؟

➤ بیضه ها در ابتدا در شکم تشکیل می شوند و قبل از تولد از طریق لوله ای به داخل کیسه بیضه حرکت می کنند. مایعات شکم از طریق لوله وارد کیسه بیضه می شوند هنگام تولد این لوله بسته هست اما گاهی باز می ماند و وقتی لوله بسته می شود مایع داخل کیسه باقی می ماند. اگر لوله باز باشد مایع داخل کیسه می تواند به جلو و عقب حرکت کند.

➤ ممکن است هیدروسل در اثر ضربه هم بوجود بیاید.

➤ خیلی کم در اثر عفونت بوجود می آید.

➤ اگر فرزند شما نارس یا کم وزن باشد ممکن است با یک هیدروسل متولد شود.



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مرکز آموزشی و درمانی کودکان



هیدروسل


(آب آوردگی بیضه)



آموزش سلامت

تاریخ تهیه: 88/5 - آخرین بازنگری: 96/5

- از محل زخم ترشح چرکی دارد.
- قسمت زیادی از اطراف زخم قرمز شده است.
- در طول 12 ساعت ادرار نداشته است.
- مرتب استفراغ می کند.
- اگر در طول روز ورم کیسه تغییر می کند.
- اگر در کشاله ران هم ورم دارد.
- بطور مداوم گریه می کند.
- کیسه بیضه دردناک است.
- کیسه بیضه قرمز شده، بزرگتر و سفت تر است.



« این پمفلت با آخرین اطلاعات پزشکی و پرستاری تهیه شده و توسط پزشکان، پرستاران و والدین دیگر مرور شده است، ولی ممکن است برای هر کودک توجهات خاصی با توجه به تشخیص و وضعیت او لازم باشد. بنابراین تنها به عنوان راهنما بوده و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک معالج کودک شما نمی باشد.»

اگر شما توصیه‌ها یا اطلاعات بیشتری نیاز دارید لطفاً با شماره تلفن 35262250 - داخلی 204 تماس بگیرید.

بعد از عمل چگونه از کودکم مراقبت کنم؟

دارو: کودک شما ممکن است چند روز اول بعد از عمل به مسکن نیاز داشته باشد که توسط جراح نسخه می شود معمولاً در این عمل نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک (داروی چرک) نیست. اگر آنتی بیوتیک لازم باشد جراح نسخه می کند و تمام دارو باید تا آخر داده شود حتی اگر حال فرزندتون بهتر شده باشد.

تغذیه: کودک شما همه چیز می تواند بخورد ولی بهتر است مایعات بیشتری داده شود.

فعالیت: از بازیهای خشن مثل دوچرخه سواری و شنا به مدت دو هفته پرهیز کند.

حمام دادن: 48 ساعت بعد از عمل، می تواند حمام کند.

پانسمان: 48 ساعت بعد از عمل پانسمان اولیه برداشته شود و دیگر نیازی به پانسمان دوباره نیست.

بخیه‌ها: 7 الی 10 روز بعد از عمل بیمار توسط جراح ویزیت می شود و بخیه‌ها برداشته می شود.

توجه

در موارد زیر کودک را سریع به دکتر ببرید:

- اگر درد دارد و با مسکن بهتر نمی شود.
- تب بالای 38 درجه دارد.
- از محل عمل خونریزی دارد و با پنج دقیقه فشار مستقیم روی محل خونریزی قطع نمی شود.